

Evidenzgrade

(nach Sackett et al.)

	Therapeutische Studie (Behandlungsergebnis)	Prognostische Studie (Krankheitsverlauf)	Diagnostische Studie (Diagnostisches Verfahren)	Ökonomische Studie (Entscheidungsmodell)
I	Prospektiv-randomisierte Studie (signifikanter Unterschied oder geringe Konfidenzintervalle)	Prospektive Studie	Testung zuvor aufgestellter Diagnosekriterien gegen den Goldstandard (aufeinander folgende Patienten)	Klinisch sensible Kosten und Alternativen; Werte von vielen Studien, Multiway- Sensitivitätsanalyse
II	<ul style="list-style-type: none">• Prospektive Kohortenstudie (Kontrollgruppe aus selbem Zeitraum, selber Einrichtung)• Prospektiv-randomisierte Studie (<80% follow-up)	<ul style="list-style-type: none">• Retrospektive Studie• Prospektive Studie (<80% follow-up)• Studie an Kontrollpatienten aus einer prospektiv- randomisierten Studie	Entwicklung von Diagnosekriterien im Vergleich zum Goldstandard (aufeinander folgende Patienten)	Klinisch sensible Kosten und Alternativen; Werte von wenigen Studien, Multiway- Sensitivitätsanalyse
III	<ul style="list-style-type: none">• Fallkontrollstudie• Retrospektive Kohortenstudie (Studie nach Behandlungsbeginn aufgesetzt)		Nicht aufeinander folgende Patienten, kein durchgehend angewandter Goldstandard	Eingeschränkte Alternativen und Kosten, schwache Schätzungen
IV	Fallserie (keine oder historische Kontrollgruppe)	Fallserie	Fallkontrollstudie Schlechter Referenz- Standard	Keine Sensitivitätsanalyse
V	Expertenmeinung			